


Perifeer ingebrachte centrale katheter



U ontvangt deze informatie, omdat u een perifeer (aan de buitenzijde) ingebrachte, centraal veneuze katheter krijgt. In deze informatie leest u meer over het inbrengen van deze katheter. Ook geven wij u advies over de omgang met de katheter en leest u wat u moet doen bij problemen.

Wat is een PICC?

Een PICC is een perifeer ingebrachte, centraal veneuze katheter (peripherally inserted central catheter). Dit is een dun, flexibel slangetje dat wij in uw bovenarm in een bloedvat inbrengen. Het uiteinde van de PICC ligt tot vlakbij het hart. Hierdoor komen de geneesmiddelen, vloeistoffen die via de katheter worden toegediend, in een groot bloedvat terecht. Deze geneesmiddelen worden snel verdund, waardoor we schade aan het bloedvat voorkomen. De PICC-lijn is geschikt voor langdurige infuusbehandeling. Via de PICC kunnen wij ook bloed afnemen.



Waarom u een PICC krijgt

Uw arts heeft u een behandeling voorgeschreven waarbij regelmatig toediening van medicatie of andere vloeistoffen direct in een bloedvat noodzakelijk is. Om de behandeling minder belastend voor u te laten zijn, krijgt u een PICC.

De PICC inbrengen

Op de behandelkamer kijkt de radioloog met een echoapparaat of in uw bovenarm een bloedvat beschikbaar is. Vervolgens brengt hij de PICC onder verdoving in. De meeste patiënten ervaren het inbrengen niet als belastend of pijnlijk. Na het inbrengen van de PICC maakt de radioloog een röntgenfoto van de borstkas. Dit doet hij om te controleren of de PICC op de goede plaats ligt. Soms moet na beoordeling van de röntgenfoto de PICC iets teruggetrokken worden om de ligging te optimaliseren. Opnieuw prikken is meestal niet nodig.

Perifeer ingebrachte centrale katheter



De PICC fixeren wij met een speciale pleister (Statlock). Aan het einde van de PICC, daar waar het infuus kan worden aangekoppeld, plaatsen wij een afsluitdopje. Het inbrengen van de PICC duurt in totaal ongeveer dertig minuten.

Na de behandeling

Neem in de volgende gevallen direct contact op met de oncologieverpleegkundige of Verpleegkundig Specialist via telefoonnummer: 015 - 260 39 46:

Indien u onder behandeling bent bij het Borstkankercentrum belt u: 015 - 260 39 35.

- bij tekenen van infectie ter hoogte van de insteekplaats of van de bovenarm. Tekenend zijn roodheid, zwelling, warmte, pijn, koorts en/of koude rilling;
- bij lekkage van vocht of bloed naast de PICC, bijvoorbeeld doordat het afsluitdopje is losgekomen;
- als uw arm of schouder opgezwollen is of als u pijn heeft tijdens het inspuiten. De positie van de PICC is dan veranderd;
- bij kortademigheid, hoesten of pijn ter hoogte van de borstkas.

Leefregels

U mag met de PICC gewoon douchen. Als de insteekplaats onder de folie bij het douchen of om andere reden vochtig is geworden, dan moeten wij deze opnieuw verzorgen.

Baden, zwemmen en saunabezoek raden wij af in verband met het risico op infectie. Zwaar tillen (10 kilogram of meer) raden wij ook af. De aanwezigheid van de PICC beperkt u verder niet in uw dagelijkse activiteiten.

Belangrijk om te weten

Houdt u rekening met de volgende punten:

- Laat nooit uw bloeddruk meten aan de arm waar de PICC is geplaatst. De PICC kan hierdoor verstopt of beschadigd raken.
- Laat nooit bloed afnemen uit een vat van de arm waar de PICC is geplaatst op de hoogte waar men de PICC zou kunnen aanprikken.
- De PICC kan maximaal een jaar in uw lichaam blijven.

De verzorging van de PICC

Een verpleegkundige van de afdeling oncologie verzorgt en spuit de PICC door. Een keer per drie weken wordt de Statlock verschoond en de Tegaderm één keer per week.

De PICC-lijn moet u één keer per week laten doorspoelen.

Heeft u vragen?

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u deze bespreken met aan uw Gespecialiseerd oncologieverpleegkundige of Verpleegkundig Specialist.